

Obecní úřad Jabkenice

Od: Leo Šklubal <leo.sklubal@atlas.cz>
Odesláno: 1. června 2021 6:45
Komu: Semčice; OU Chudíř; Dobrovice MeU; Pěčice OU; jabkenice OU; ujkovice OU; Prodašice OU; Ctiměřice OU; Charvátce OU; Žerčice OU; Ledce OU
Předmět: Očkování Covid V Semčicích
Přílohy: Souhlas-Janssen (1).docx

Janssen Covid-19 Vakcína

v počtu 50 kusů přistála nečekaně v Semčicích.
S dodávkou dalších kusů...NEPOČÍTÁM !!!

JAK PROBĚHNE OČKOVÁNÍ :

Je to očkování jedinou injekcí.
Tato dodávka je určena VÝHRADNĚ PRO MOJE PACIENTY NAD 70 LET VĚKU.
Ostatní věkové kategorie se obrátí na očkovací centra.

Vakcína se podává v jedné dávce (0,5 ml) a stává se účinnou asi 28 dní po očkování. Podle WHO by měl být také minimální interval 14 dnů mezi podáním této vakcíny a jakékoli jiné vakcíny.

Vícedávková injekční lahvička obsahuje 5 dávek po 0,5 ml.
Po otevření lahvičky je nutné obsah doočkovat do 3 hod...jinak se obsah znehodnotí.
Z toho vyplývá nutnost ZAJISTIT PŘÍTOMNOST 50 SENIORŮ v malém časovém prostoru.

AKCE PROBĚHNE TAKTO:

OČKOVÁNÍ ZAČNE VE ČTVRTEK 3.6.2021 OD 9.00 HOD A SKONČÍ DO 12.00 HOD .

/OSTATNÍ PACIENTI BUDOU OŠETŘENI NÁSLEDUJÍCÍ DEN...PÁ 4.6.2021 A DNY NÁSLEDUJÍCÍ.../

Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň 15 minut pod dohledem zdravotníka .
Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování na zadání e-mail nebo jeho papírový výtisk.
Případně může očkovaná osoba využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat, aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.

Obecní úřady prosím o namnožení poučení , které senior přinese k očkování již podepsané.
Děkuji.

MUDr. Šklubal Leo

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM OČKOVACÍ LÁTKY

COVID-19 Vaccine Janssen injekční suspenze

Jméno a příjmení očkovaného :

Datum :

Datum narození :

Telefoniční číslo (e mail) :

Vážená paní / Vážený pane,
projevila(a) jste zájem o očkování proti nemoci COVID-19. Bude Vám podána očkovací látka COVID-19
COVID-19 Vaccine Janssen (dále jen „očkovací látka“), která je určena pro osoby od 18let věku.

Cílem očkování je zabránit vzniku onemocnění COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2.
Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato očkovací látka nemusí plně ochránit očkovaného
proti nemoci.

Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další otázky, máte možnost konzultace svého
záměru o očkování s lékařem. Níže uvedený dotazník nám pomůže určit, zda by se očkování mělo provést
nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte „ano“, neznamená to, že nemůžete
být očkován(a). **Vakcinace má být odložena u osob s akutním závažným horečnatým onemocněním**
nebo akutní infekcí.

Cítíte se dnes nemocný(á) ?	ANO / NE
Prodělal/a jste onemocnění COVID-19 nebo jste měl/a pozitivní PCR test ?	ANO / NE
Byl(a) jste někdy očkován(a) proti nemoci COVID-19 ?	ANO / NE
Měl(a) jste někdy vážnou alergickou reakci na jiné očkování ?	ANO / NE
Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na „ředění“ krve ?	ANO / NE
Máte nějakou závažnou poruchu imunity ?	ANO / NE
Jste těhotná nebo kojíte ?	ANO / NE
Absolvoval(a) jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování ?	ANO / NE

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do svalu na rameni. Vakcína je jednodávková. Ochrana
začíná přibližně přibližně 14 dnů po vakcinaci. Doba ochrany poskytovaná vakcína není známa.

**Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující příznaky závažné
alerгické reakce.** Tyto reakce mohou zahrnovat kombinaci kterýchkoliv z těchto příznaků : pocit na
omalení nebo točení hlavy, změny srdečního tepu, dušnost, pískoty při dýchání (sípot), otok rtů, obličeje
nebo hrudla, kopřívka nebo vyrážka, pocit na zvracení nebo zvracení, bolest bricha.

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky, většinou jsou lehké a odezní během několika dnů.
Patří k nim citlivost, bolest, pocit tepla, svědění, zduření, zarudnutí nebo tvorba modřiny v místě injekce,
pocit únavy nebo celkový pocit nepohody, zimnice, zvýšená tělesná teplota mírná bolest hlavy, bolest
kloubů nebo svalů pocit na zvracení (nauzea), zvracení nebo průjem. **Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli
z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.**

Po očkování vakcínu byla velmi vzácně pozorována kombinace trombózy a trombocytopenie, v
některých případech doprovázená krvácením. **Pokud by se u Vás po vakcinaci objevily příznaky jako
dušnost, bolest na hrudi, otok nohy, velmi silné bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo modřiny na
kůži v jiném místě než vakcinace, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.**

Podpisem potvrzuji, že jsem lékař nezamlčel žádné informace o svém zdravotním stavu a rozumím
poskytnutým informacím o očkování proti Covid -19, včetně informace o možných nežádoucích účincích.

Podpis (souhlas) očkovaného :